



تریگارد 75 پودر با قابلیت تر شوندگی

Trigard® 75WP

کم خطر، سیستمیک و موثر

- حشره‌کشی کاملاً انتخابی بدون اثر سوء بر روی کنه‌های شکاری، زنبورهای پارازیتوئید و زنبورعسل
- بهترین حشره‌کش برای مدیریت مبارزه تلفیقی IPM
- تاثیر سریع، متفاوت و بی‌رقیب
- موثرترین راه مبارزه با مگس مینوز

تریگارد بیش از ۱۵ سال است که در بیشتر کشورهای مهم تولیدکننده سبزی و صیفی در دنیا استفاده می‌شود و در حال حاضر تریگارد محصول پیشرو در کنترل مینوز برگ در سبزی و صیفی می‌باشد و در برخی کشورهای دنیا نیز به عنوان متخصص کنترل مینوز برگ شناخته می‌شود.

تریگارد حاوی ۷۵۰ گرم ماده موثره سیرومازین در هر کیلوگرم است. تریگارد با فعالیت نفوذی قوی و خاصیت سیستمیک، خسارت مگس مینوز را کاهش می‌دهد. این سم از گروه تنظیم کننده‌های رشد IGR است که با تداخل در چرخه پوست‌اندازی حشرات مانع از تکامل مراحل لاروی حشرات و شفیرگی شده، در نهایت موجب مرگ آنها می‌شود. تریگارد پس از مصرف به سرعت از طریق برگ‌ها جذب شده و با خاصیت سیستمیکی و تماسی و گوارشی لاروها را از بین می‌برد. تریگارد حشرات بالغ را از بین نمی‌برد اما تعداد تخم‌های بارور را کاهش می‌دهد. تریگارد از گروه تری‌آزین‌ها و با روش اثر کاملاً متفاوت نسبت به سموم ارگانوفسفات و پیروتریویدی، گزینه مناسبی جهت استفاده در برنامه کنترل تلفیقی آفت (IPM) می‌باشد. تریگارد بسیار کم خطر است. درجه سمیتی معادل ۴۴۶۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم دارد که آن را نسبت به بسیاری از سموم برای انسان ایمن‌تر می‌نماید. این حشره‌کش علاوه بر جذب برگ‌ی قابلیت جذب از طریق ریشه‌های و انتقال به اندام‌های هوایی را دارد. تریگارد را باید حتماً در آغاز پیدایش آلودگی، زمانی که لاروها کوچک هستند مصرف نمود زیرا لارو مگس را در مرحله تغییر پوست می‌کشد.


 **Trigard®**

 **syngenta®**

Bringing plant potential to life

تریگارد چگونه عمل می‌کند؟

تریگارد با تاثیر بر ماده‌های بالغ باعث تولید تخم‌های غیربارور می‌گردد



زمان و نحوه مصرف:

آفت	میزان مصرف	زمان مصرف
مگس مینوز جالیز <i>Liriomyza spp</i>	۰/۴ در هزار لیتر آب در خیار گلخانه‌ای (۴۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب)	بامشاهده اولین دالان های لارو در برگ در صورت نیاز به تکرار ۸-۱۴ روز پس از سمپاشی اول

نکات مهم:

- در صورت لزوم تکرار سمپاشی با رعایت فاصله زمانی ۱۴ روزه و به منظور به تاخیر انداختن پدیده مقاومت برای سمپاشی دوم از ورتیمک استفاده گردد.
- تریگارد به سرعت در برگ جذب و ظرف ۲ - ۴ ساعت در گیاه پخش می‌شود.
- ماندگاری اثر تریگارد ۱۰ تا ۱۴ روز پس از مصرف می‌باشد.
- تریگارد با داشتن نحوه تاثیر متفاوت قادر است حشرات مقاوم به سموم رایج را بخوبی کنترل کند.
- تریگارد برای ماهی و سایر موجودات آبی و پرندگان سمیت ندارد.
- تریگارد در بسته های ۲۵ گرمی (ساشه) قابل حل در آب عرضه می‌گردد.

پنج قانون طلایی:

- همیشه جانب احتیاط را رعایت کنید
- خواندن و درک برچسب محصول
- رعایت اقدامات بهداشت شخصی
- پوشیدن تجهیزات ایمنی مناسب (PPE)
- مراقبت و تنظیم تجهیزات سمپاشی



syngenta®



شرکت رها اندیش کاوان
تهران، الهیه، خیابان خزر شمالی
نبش کوچه معینی، پلاک ۱۸

کد پستی: ۱۹۱۴۸۳۵۷۹۱
تلفن: ۰۲۱- ۸۵۵۹۶
فکس: ۰۲۱- ۲۲۶۱۴۱۹۰

syngenta

تهران، ونک، خیابان ملاصدرا
تقاطع شیخ بهایی، پلاک ۱۱۰ و ۱۱۲
طبقه هفتم

تلفن: ۰۲۱- ۸۸۶۱۶۸۲۲
فکس: ۰۲۱- ۸۹۷۸۰۶۵۶
www.syngenta.ir
@syngenta_iran